



Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Darreichungsform und Stärke von MabThera® auswählen

SUBKUTANE INJEKTION

**MabThera 1.400 mg
NUR ZUR ANWENDUNG BEI NHL***



Rosa Flip-off-Deckel

Direkt aus der Durchstechflasche entnehmen und als subkutane Injektion verabreichen.



Überprüfen Sie vor der Anwendung die für MabThera SC spezifischen Verpackungscharakteristika:
Rot gedruckt: „Nur zur subkutanen Anwendung“, „Lösung zur subkutanen Injektion“ und „subkutan“.

* NHL = Non-Hodgkin-Lymphom.

Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation).

Beachten Sie bitte für weitere Informationen die Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation).

INTRAVENÖSE INFUSION

**MabThera 100 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
MabThera 500 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Zur Anwendung bei allen zugelassenen Indikationen von MabThera#**



Mit 0,9%iger Kochsalzlösung oder 5%iger Glukoselösung verdünnen und als intravenöse Infusion verabreichen.



Verwenden Sie den Abziehstreifen des Etiketts, um sicherzustellen, dass Ihrem Patienten, wie unten dargestellt, die richtige Formulierung und Stärke verabreicht wird.

**MabThera 1.400 mg Lösung zur subkutanen Injektion
NUR ZUR ANWENDUNG BEI NHL**



1. Das Etikett der Durchstechflasche von MabThera 1.400 mg hat einen abziehbaren Streifen.



2. Entfernen Sie den Abziehstreifen.



3. Kleben Sie den Abziehstreifen auf die Spritze.



Roche Pharma AG
79630 Grenzach-Wyhlen
© 2017 – Alle verwendeten Handelsnamen sind rechtlich geschützt.
Stand der Information: April 2017
Parallel vertrieben von: INOPHA GmbH, 14974 Ludwigsfelde, Deutschland

Version 2.0
Erstelldatum: April 2017
Datum der Behördengenehmigung: 21/04/2017

